

Laji	Talvikanta 2016 yksilöitä	Muutos 1987- 2014	Uhanalaisuus Itämeri 2013	Flyway %
Kyhmyjoutsen <i>Cygnus olor</i>	8600	+		3,7 %
Laulujoutsen <i>Cygnus cygnus</i>	4100	+		6,9 %
Kanadanhanhi <i>Branta canadensis</i>	80	-		0,1 %
Haapana <i>Anas penelope</i>	15	+/-		0,0 %
Tavi <i>Anas crecca</i>	50	+/-		0,0 %
Sinisorsa <i>Anas platyrhynchos</i>	32000	+/-		0,7 %
Punasotka <i>Aythya ferina</i>	20	+/-		0,0 %
Tukkasotka <i>Aythya fuligula</i>	57000	+		4,7 %
Lapasotka <i>Aythya marila</i>	100	+/-		0,0 %
Allihaahka <i>Polysticta stelleri</i>	15	-	EN	0,0 %
Haahka <i>Somateria mollissima</i>	40	-	EN	0,0 %
Alli <i>Clangula hyemalis</i>	21000	+	EN	1,3 %
Mustalintu <i>Melanitta nigra</i>	900	+/-	EN	0,2 %
Pilkkasiipi <i>Melanitta fusca</i>	400	+/-	EN	0,1 %
Telkkä <i>Bucephala clangula</i>	22000	+		1,9 %
Uivelo <i>Mergellus albellus</i>	1300	+		5,1 %
Tukkakoskelo <i>Mergus serrator</i>	320	+/-	VU	0,2 %
Isokoskelo <i>Mergus merganser</i>	24000	+		9,0 %
Kaakkuri <i>Gavia stellata</i>	50	-	CR	0,0 %
Kuikka <i>Gavia arctica</i>	20	-	CR	0,0 %
Pikku-uikku <i>Tachybaptus ruficollis</i>	20	+		0,0 %
Silkkuiikku <i>Podiceps cristatus</i>	40	+/-		0,0 %
Härkälintu <i>Podiceps grisegena</i>	5	+/-	EN	0,0 %
Merimetso <i>Phalacrocorax carbo</i>	1000	+/-		0,3 %
Nokikana <i>Fulica atra</i>	210	+/-		0,0 %
Merisirri <i>Calidris maritima</i>	720	+		1,0 %
Naurulokki <i>Larus ridibundus</i>	430	+/-		0,0 %
Ruokki <i>Alca torda</i>	40	+/-		0,0 %
Riskilä <i>Cephus grylle</i>	580	-	NT	1,2 %